



TYLOL[®]HOT

60mg+500mg+4mg, oralni prašak
pseudoefedrin, paracetamol, hlorfenamin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek TyloL Hot, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek TyloL Hot i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TyloL Hot
3. Kako se upotrebljava lek TyloL Hot
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek TyloL Hot
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK TYLOL HOT I ČEMU JE NAMENJEN

Paracetamol smanjuje bolove i snižava telesnu temperaturu. Hlorfenamin smanjuje simptome alergijske reakcije kao što su curenje iz nosa, otok nosne sluznice, crvenilo i/ili reakcije preosetljivosti na oku. Pseudoefedrin sužava krvne sudove i otklanja otok sluznice u gornjim disajnim putevima.

- TyloL Hot se upotrebljava kada osetite jedan ili više sledećih znakova bolesti:
- opšta slabost
- povišena telesna temperatura i glavobolja
- curenje iz nosa
- otok nosne sluznice
- kijanje
- obični bolovi

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TYLOL HOT

Lek TyloL Hot ne smete koristiti:

TyloL Hot ne treba da koriste pacijenti koji su alergični na bilo koji od njegovih sastojaka. Takođe, pacijenti sa teškim oboljenjem jetre i bubrega ne treba da koriste ovaj lek. Pacijenti koji se leče inhibitorima monoaminoooksidaze (MAO inhibitori) ne smeju da uzmu TyloL Hot,

ako nije prošlo najmanje 2 nedelje posle unošenja poslednje doze MAO inhibitora. TyloL Hot je namenjen odraslim pacijentima stoga njegova primena je kontraindikovana kod dece.

Kada uzimate lek TyloL Hot, posebno vodite računa:

Ako imate neko oboljenje jetre, bubrega, srca i pluća ili anemiju, lek treba da koristite pod nadzorom lekara. TyloL Hot ne treba da uzimate pacijenti sa teškim srčanim poremećajima, dijabetes melitusom, bronhijalnom astmom, glaukomom, hipertireozom i hipertenzijom. Pacijenti koji se leče lekovima protiv hipertenzije ili protiv depresije, treba da se posavetuju sa lekarom. TyloL Hot ne treba uzimati za lečenje oboljenja kod kojih se ponavlja povišena telesna temperatura u trajanju više od 3 dana iznad 39,5°C, osim kada to lekar preporuči. TyloL Hot (odnosno njegov sastojak pseudoefedrin) ne dovodi do povišenja krvnog pritiska kod osoba sa normalnim pritiskom. TyloL Hot ne smeju koristiti deca.

Primena drugih lekova

Kada se uzima u preporučenim dozama TyloL Hot ne dovodi do poremećaja ako se uzima sa drugim lekovima. Ako se unose veće doze i lečenje traje duže nego što je preporučeno, paracetamol može da reaguje sa oralnim antikoagulantima i fenotiazinima. Alkohol, barbiturati i antidepresivi mogu da pojačaju štetna dejstva paracetamola na jetru. Krvni pritisak se može povećati kao posledica istovremene primene pseudoefedrina sa drugim lekovima koji smanjuju otok sluznice, trcikličnim antidepresivima, lekovima za smanjenje apetita, amfetaminskim psihostimulansima i MAO inhibitorima. Metildopa, i adrenergički blokatori, gvanetidin mogu izgubiti efikasnost ako se daju istovremeno sa pseudoefedrinom.

Primena leka TyloL Hot u periodu trudnoće i dojenja

Primena TyloL Hot-a se ne savetuje tokom trudnoće i dojenja.

Uticaj leka TyloL Hot na upravljanje

motornim vozilima i rukovanje mašinama
Zamor se može javiti tokom terapije TyloL Hot-om; stoga se mora voditi računa tokom vožnje automobila i rada na opasnim mašinama. Istovremeno uzimanje TyloL Hot-a sa alkoholom treba izbegavati, jer to može dovesti do dodatnog smanjenja pažnje.





3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TYLOL HOT

Tylol Hot se uzima oralno, prema sledećim uputstvima: Sadržaj svake kesice treba rastvoriti u 160 ml (=obična čaša za vodu) tople vode, i odmah ga treba popiti bez odlaganja. Ukoliko je potrebno, sledeću dozu možete uzeti kada prodje 6 časova. Uobičajeni režim doziranja pseudoefedrina je 60 mg (1 kesica) 3 puta dnevno. U toku dana (24 časa) možete popiti najviše 4 kesice. Ne preporučuje se kontinuirana primena leka duže od 5 dana.

Ako ste uzeli više leka Tylol Hot nego što je trebalo

Paracetamol u toksičnim dozama može izazvati oštećenje jetre. Kod odraslih, unošenje ukupne količine od 10 gr paracetamola. Znaci trovanja se javljaju 1-6 časova posle unošenja leka. Rani simptomi oštećenja jetre su mučnina, povraćanje, pojačano znojenje i opšta slabost. Kod trovanja paracetamolom, kao protiv-otrov se primenjuje acetilcistein.

Toksičnost hlorfenamina se manifestuje nekoliko časova posle unošenja: lečenje se sprovodi prema preporuci za lečenje predoziranja antihistaminicima / antiholinergicima.

Simptomi predoziranja pseudoefedrina su: blaga anksioznost, lupanje srca i/ili blaga hipertenzija. Simptomi se obično javljaju 4-8 časova posle unošenja leka. Svi simptomi su prolazni i specifična terapija nije potrebna.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tylol Hot

Ako ste zaboravili da uzmete lek na vreme, možete nastaviti tako što ćete popiti 1 kesicu Tylol Hot-a, ali posle toga opet treba da prodje najmanje 6 časova pre nego što uzmete sledeću dozu. Nikada ne treba da uzmete više od 4 kesice za 24 časa.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Tylol Hot se uglavnom dobro podnosi. Paracetamol u terapijskim dozama nema toksičnih dejstava. U retkim slučajevima, može izazvati reakcije preosetljivosti kao što su koprivnjača, osip sa čvorčićima po koži; a posle unošenja većih doza tokom dužeg vremena može doći do smanjenja broja trombocita, leukocita ili svih krvnih ćelija. Veoma su retki: smanjenje broja neutrofila, pojava trombocitopenijske purpura i agranulocitoza. Sporedna dejstva pseudoefedrina su veoma retka. Može se javiti nesanic, veoma retko halucinacije. Može doći do crvenila kože i otežanog mokrenja; ovo poslednje se može desiti kod osoba koje imaju hiperplaziju prostate. Hlorfenamin može ponekad izazvati pospanost, zamagljen vid, teškoće sa mokrenjem, suva usta, glavobolja, ubrzan rad srca i dr.

5. KAKO ČUVATI LEK TYLOL HOT

Rok upotrebe
3 godine. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje
Držati lek Tylol Hot van domašaja dece! Ovaj medicinski proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tylol Hot

Sadržaj aktivnih supstanci: pseudoefedrin, paracetamol, hlorfenamin
Sadržaj pomoćnih supstanci: limunska kiselina (anhidrid), tartarična kiselina, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-karbonat, polivinilpirolidon (PVP K 30), saharoza, natrijum-benzoat, hinolinžuto (E104), aroma limuna.

Kako izgleda lek Tylol Hot i sadržaj pakovanja

U jednoj kutiji Tylol Hot upakovano je 6 ili 12 kesica.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: Predstavništvo NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A.Ş.

Molerova 78, Beograd-Vračar

Proizvođač:

NOBELFARMA ILAČ SANAYII VE TICARET A.Ş.
Sancaklar 81100 Düzce, Turska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2009.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Tylol®Hot, oralni prašak, 12x(60 mg+500 mg+4

mg), Reš.br. 1181/2006/12 od 13.07.2006

Tylol®Hot, oralni prašak, 6x(60 mg+500 mg+4

mg), Reš.br. 2561/2009/12 od 06.05.2009



12001454 / 000



NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A. Ş.

